

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

滋養強壮剤

第2類医薬品

レオピソ ファイブ キャップレット

製品の特徴

レオピソ ファイブ キャップレットSは、ニンニクを長期間かけ抽出・熟成し、濃縮して得られた濃縮熟成ニンニク抽出液に、ニンジンエキス、ゴオウ末、シベット散及びビタミンB₁を配合した滋養強壮剤です。

本剤は、表面にコーティングをほどこしてありますので、ニンニクなど成分特有の味やにおいは気になりません。のみやすいカプセル形の錠剤(キャップレット)で、8才以上のお子様、妊娠授乳期の方にも服用いただけます。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感
3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
4. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

大人(15才以上)の場合

- 滋養強壮
- 虚弱体質
- 肉体疲労・病後の体力低下・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

8才以上15才未満の場合

- 滋養強壮
- 虚弱体質
- 偏食児・小児の発育期・病後の体力低下・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給

用法・用量

1回下記量を水又はお湯と一緒に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人(15才以上)	2錠	2回
8才以上15才未満	1錠	
8才未満	服用しないでください	

<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(裏面へつづく)

成分とはたらき

成 分	分量 (4錠中)	は た ら き
濃縮熟成ニンニク抽出液	1.6mL	ニンニクの鱗茎を長期間かけ抽出・熟成し、濃縮して得られた抽出液で、ニンニク特有の刺激や臭いはほとんどなく、虚弱体質や肉体疲労時などにすぐれた滋養強壮効果を発揮します。
ニンジンエキス	200mg	薬用人参ともよばれるウコギ科オタネニンジンの根のエキスで、虚弱体質や病後の体力低下時などにすぐれた滋養強壮効果をあらわします。
ゴオウ末	2mg	牛の胆のうもしくは胆管中にまれに見つかる結石から製した粉末で、滋養強壮剤として医薬品に広く使用されています。
シベット散	7.5mg	ジャコウネコの香腺分泌物から製した散剤で、強壮生薬として使用されています。
ビタミンB ₁ 塩酸塩	20mg	体内でのエネルギー産生回路に必須な栄養素の一つで、肉体疲労時や病後の体力低下時などの場合のビタミンB ₁ 不足を補います。

添加物として、香料、乳糖、タルク、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、含水二酸化ケイ素、酸化チタン、三二酸化鉄、ヒプロメロース、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、トリアセチン、マクロゴール、カルナウバロウを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 錠剤をぬれた手で扱わないでください。
- (5) ぬれた錠剤はボトルに戻さないでください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (7) ボトルの詰め物は、輸送中の内容物の破損を防ぐためのものです。
開封後は不要となりますので、取りのぞいてください。

《販売名》レオピンファイブキャップレットS

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

☎ 0570-666-170

受付時間 9時～12時、13時～17時（土、日、祝日を除く）

製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624
<http://www.wakunaga.co.jp/>